





PRODOTTI AD ADESIONE PER SOCIETÀ AFFILIATE PERSONALE NON TESSERATO ADDETTO A GARE O MANIFESTAZIONI

LE GARANZIE INFORTUNI, PREVISTE PER I TESSERATI, SONO ESTESE, IN SEGUITO A RICHIESTA SCRITTA E PAGAMENTO PREMIO A:

• Personale non tesserato addetto a gare e/o manifestazioni.

1) MODALITÀ PER LA COMUNICAZIONE DI PERSONALE NON TESSERATO ADDETTO DA ASSICURARE

La Società organizzatrice (Contraente - Comitato o Delegazione Territoriale, Società/Associazione sportiva affiliata) della gara o manifestazione dovrà comunicare preventivamente al Broker:

- Denominazione della manifestazione da assicurare;
- · L'elenco nominativo del personale addetto;
- Decorrenza e durata della manifestazione;
- Fotocopia dell'avvenuto versamento al broker, a mezzo bonifico bancario, dell'importo del premio dovuto.

PARTECIPANTI A CORSI, GARE E/O MANIFESTAZIONI

LE GARANZIE INFORTUNI, PREVISTE PER I TESSERATI, SONO ESTESE, IN SEGUITO A RICHIESTA SCRITTA E PAGAMENTO PREMIO AI:

• Partecipanti a corsi, gare e/o manifestazioni.

2) MODALITÀ PER LA COMUNICAZIONE DI PARTECIPANTI DA ASSICURARE

La Società organizzatrice (Contraente - Comitato o Delegazione Territoriale, Società/Associazione sportiva affiliata) del corso, della gara o manifestazione dovrà comunicare preventivamente al Broker:

- Denominazione della manifestazione da assicurare;
- L'elenco nominativo dei partecipanti;
- Decorrenza e durata della manifestazione;
- Fotocopia dell'avvenuto versamento al broker, a mezzo bonifico bancario, dell'importo del premio dovuto.







| Personale non tesserato addetto a gare e manifestazioni (premi per singola giornata) | | | | | |
|--|---|--------|--|--|--|
| Fino a 30 addetti | € | 140,00 | | | |
| Da 31 a 50 addetti | € | 220,00 | | | |
| Ogni addetto oltre i 50 | € | 4,40 | | | |

| Partecipanti a corsi, gare e | e manifestazioni (premi per singola giornata) |
|-------------------------------|---|
| Fino a 100 partecipanti | € 330,00 |
| Da 101 a 300 partecipanti | € 660,00 |
| Ogni partecipante oltre i 300 | € 4,40 |

MODALITA' ADESIONE CONVENZIONE MULTIRISCHI FIHP

Qui di seguito vengono indicate le modalità per attivare la copertura dei rischi.

<u>Personale non tesserato addetto a gare e manifestazioni e partecipanti non tesserati a gare e manifestazioni</u>

- 1) La società affiliata dovrà compilare in ogni sua parte l'allegato Modulo A);
- 2) La Società dovrà provvedere al versamento attraverso bonifico bancario del totale della Colonna)nominata "premio" sul seguente c/c intestato a:

AON S.p.A.; UNICREDIT S.p.A. C/C INTESTATO AON S.p.A. IBAN IT 84 K 02008 09434 000500073869 SWIFT/BIC UNCRITMMOMM

 La società dovrà inviare via fax copia del modulo A) con allegata copia del bonifico bancario effettuato alla AON S.p.A al seguente numero di fax: 06 / 77400338



Ente Organizzatore____





Foglio n.

MODELLO A (Personale addetto a gare e manifestazioni e partecipanti a Corsi, Gare e Manifestazioni)

(premi per singola giornata)

| | nazione della manifestazione | |
|--------|-------------------------------|--------------|
| Durata | e decorrenza della manilestaz | cione: DalAl |
| | | |
| N. | Nome | Cognome |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |







Coperture Assicurative Integrative (ad adesione dei singoli Tesserati)

Per tutti i Tesserati sarà possibile aderire ad una formula **integrativa**, grazie alla quale poter aumentare i massimali e ridurre le franchigie contrattuali come da la tabella sotto esposta:

| GARANZIE | BASE | INTEGRATIVA |
|------------------------------|--|---|
| CASO MORTE | € 90.000 | € 100.000 |
| CASO LESIONI | € 90.000 FRANCHIGIA: Vedi Tabella Lesioni "Franchigia Base" | € 100.000 FRANCHIGIA: Vedi Tabella Lesioni "Franchigia Integrativa" |
| RIMBORSO SPESE MEDICHE | GARANZIA NON PRESTATA | € 5.000,00 Scoperto 10% con il minimo di € 150,00 per evento. Sottolimite cure fisioterapiche: garanzia prestata con limite di € 2.000,00 per anno e per persona ed un massimo di € 50,00 per singola prestazione. Sottolimite cure odontoiatriche: garanzia con limite € 1.500,00 per |
| DIARIA DA GESSO | GARANZIA NON PRESTATA | anno e per persona. € 30,00 al giorno con franchigia di 3 (tre) giorni con il massimo di 60 (sessanta) giorni |
| | | PREMIO ANNUO LORDO: € 21,50 |

COME ADERIRE ALLA FORMULA INTEGRATIVA

Il singolo Tesserato che deciderà di aderire ad una o più formule integrative, dovrà semplicemente compilare il form "Modalità di Adesione", stampare il **Modulo di Adesione** generato al termine della procedura, sottoscriverlo in ogni sua parte ed inviarlo al broker mezzo fax al numero **06.77400**338, unitamente ad una copia del documento attestante l'avvenuto pagamento del premio, riportante il timbro della banca ovvero il numero di CRO/TRN.

Le garanzie previste dalle formule integrative decorrono dalle ore **24.00 del giorno di ricezione**, da parte del Broker, del modulo di adesione regolarmente compilato e sottoscritto e della copia dell'ordine di bonifico attestante il versamento del premio assicurativo. Scadranno il **31 Luglio di ciascun anno**.

Ricordiamo che il Modulo di Adesione deve essere conservato con cura, poiché, unitamente alle condizioni di assicurazione, costituisce parte integrante del contratto di assicurazione e rappresenta il documento comprovante l'avvenuta adesione alla formula integrativa.

| TIPOLOGIA DI LESIONE | PERC. | FRANCHIGIA BASE | FRANCHIGIA INTEGRATIVA |
|---|----------------|--------------------|---------------------------|
| LESIONI APPARATO SCHELETRICO | | | |
| CRANIO | | | |
| FRATTURA OSSO FRONTALE O OCCIPITALE O PARIETALE O TEMPORALE O LINEE DI FRATTURA INTERESSANTI TRA LORO TALI OSSA | 7,00% | , | , |
| FRATTURA SFENOIDE | 5,00% | , | , |
| FRA TTURA OSSO ZIGOMATICO O MASCELLARE O PALA TINO O LINEE DI FRA TTURA INTERESSANTI TRA LORO TALI OSSA | 3,00% | , | , |
| FRATTURA LEFORT I° (dístacco dell'arcata dentaria superiore dal mascellare) FRATTURA LEFORT II° O III° (non cumulabili tra loro né con LEFORT I°) | 4,00% 7,00% | , | |
| FRATTURA ETMOIDE | 3,00% | , | , |
| FRATTURA OSSO LACRIMALE 0 JOIDEO 0 VOMERE (non cumulabíle) | 2,00% | , | |
| FRATTURA OSSA NASALI | 2,50% | , | , |
| FRATTURA MANDIBOLARE(PER LATO) | 4,00% | , | , |
| LACERAZIONE DEL TIMPANO DA BAROTRAUMA | 5,00% | | |
| TRAUMA CRANICO COMMOTIVO CON FOCOLAI CONTUSIVI A LIVELLO CEREBRALE | 8,00% | 6 7,10% | 5,80% |
| COLONNA VERTEBRALE | | | |
| TRATTO CERVICALE | | | |
| FRATTURA CORPO III °-IV °-V °-VI °-VII ° VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA) | 6,00% | 6 5.33% | 4,35% |
| FRATTURA PROCESSO SPINOSO O PROCESSI TRASVERSI III°-IV°-V°-VII° VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA) | 2,00% | , | , |
| FRATTURA CORPO O PROCESSO TRASVERSO O PROCESSO SPINOSO II° VERTEBRA | 8,00% | , | , |
| FRATTURA ARCO ANTERIORE O ARCO POSTERIORE O MASSE LATERALI (PROCESSO TRASVERSO 0 PROCESSI ARTICOLARI) I- VERTEBRA | 10,00% | , | , |
| TRATTO DORSALE | | | |
| FRATTURA DEL CORPO DALLA I° ALLA XI° VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA) | 4,00% | 6 3,55% | 2,90% |
| FRATTURA DEL CORPO XII° VERTEBRA | 8,00% | , | , |
| FRATTURA PROCESSO SPINOSO O PROCESSI TRASVERSI DALLA Iº ALLA XIIº VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA) | 2,00% | | * |
| TRATTO LOMBARE | | | |
| | | , | = |
| FRATTURA CORPO (PER OGNI VERTEBRA) | 8,00% | , | , |
| FRATTURA PROCESSO SPINOSO O PROCESSI TRASVERSI DALLA I° ALLA V° VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA) | 2,00% | 6 1,78% | 1,45% |

| TIPOLOGIA DI LESIONE | PERC. | FRANCHIGIA BASE | FRANCHIGIA INTEGRATIVA |
|--|---|--|--|
| OSSO SACRO | | BAGE | III Zanama |
| FRATTURA CORPI VERTEBRALI O BASE O ALI O PROCESSI ARTICOLARI O APICE O CRESTE SPINALI | 4,00% | 3,55% | 2,90% |
| COCCIGE | | | |
| FRATTURA CORPI O BASE O CORNA O PROCESSI TRASVERSI O APICE | 4,00% | 3,55% | 2,90% |
| BACINO | | | |
| FRATTURA ALI ILIACHE O BRANCA ILEO-ISCHIO-PUBICA (DI UN LATO) O DEL PUBE FRATTURA ACETABOLARE(PER LATO) | 3,00% 6,00% | , | , |
| TORACE | | | |
| FRATTURA CLAVICOLA(PER LATO) FRATTURA STERNO FRATTURA DI UNA COSTA(COMPOSTA) FRATTURA DI UNA COSTA(SCOMPOSTA) FRATTURA SCAPOLA(PER LATO) PNEUMOTORACE DA BAROTRAUMA PNEUMOPERICARDIO DA BAROTRAUMA | 4,00% 2,00% 0,50% 1,50% 3,00% 6,00% | 1,78% 0,44% 1,33% 2,66% 5,33% | 1,45% 0,36% 1,09% 2,18% 4,35% |
| ARTO SUPERIORE (DX o Sn) | | | |
| BRACCIO | | | |
| FRATTURA DIAFISARIA OMERALE FRATTURA EPIFISI PROSSIMALE O SUPERIORE OMERALE (DELIMITATA DAL COLLO CHIRURGICO) FRATTURA EPIFISI DISTALE O INFERIORE OMERALE (DELIMITATA DALLA LINEA IDEALE CHE UNISCE TROCLEA E CAPITELLO) | 3,00% 6,00% 6,00% | 5,33% | 4,35% |
| AVAMBRACCIO | | | |
| FRATTURA DIAFISARIA RADIALE FRATTURA EPIFISI PROSSIMALE RADIO(FRATTURA TUBEROSITA' RADIALE O CAPITELLO O COLLO O CIRCONFERENZA ARTICOLARE) FRATTURA EPIFISI DISTALE RADIO(FACCIA ARTICOLARE CARPICA O PROCESSO STILOIDEO O INCISURA ULNARE) FRATTURA DIAFISARIA ULNARE FRATTURA EPIFISI PROSSIMALE ULNA (OLECRANO O PROCESSO CORONOIDEO O INCISURA SEMILUNARE E RADIALE) FRATTURA EPIFISI DISTALE (CAPITELLO O CIRCONFERENZA ARTICOLARE O PROCESSO STILOIDEO) FRATTURA BIOSSEA RADIO E ULNA COMPOSTA FRATTURA BIOSSEA RADIO E ULNA SCOMPOSTA | 2,00% 4,00% 4,00% 2,00% 4,00% 4,00% 5,00% | 3,55% 3,55% 1,78% 3,55% 3,55% 3,55% | 2,90% 2,90% 1,45% 2,90% 2,90% 2,90% |

| TIPOLOGIA DI LESIONE | PERC. | FRANCHIGIA BASE | FRANCHIGIA INTEGRATIVA |
|---|-------|--------------------|---------------------------|
| POLSO E MANO | | | |
| FRATTURA SCAFOIDE | 5,00% | 4,44% | 3,63% |
| FRATTURA SEMILUNARE | 3,00% | 2,66% | 2,18% |
| FRATTURA PIRAMIDALE | 2,00% | 1,78% | 1,45% |
| FRATTURA PISIFORME | 1,00% | 0,89% | 0,73% |
| FRA T-TURA TRAPEZIO | 2,00% | 1,78% | 1,45% |
| FRATTURA TRAPEZOIDE | 2,00% | 1,78% | 1,45% |
| FRATTURA CAPITATO | 2,00% | 1,78% | 1,45% |
| FRATTURA UNCINATO | 2,00% | | |
| FRATTURA I° METACARPALE | 6,00% | | |
| FRATTURA II° O III° O IV° O V° METACARPALE | 3,00% | | |
| SINDROME DA TUNNEL CARPALE O M. DI DUPUYTREN (trattato chirurgicamente) | 4,00% | 3,55% | 2,90% |
| FRATTURA PRIMA FALANGE DITA | | | |
| POLLICE | 4,00% | 3,55% | 2,90% |
| INDICE | 3,00% | 2,66% | 2,18% |
| MEDIO | 3,00% | | |
| ANULARE | 2,00% | , | , |
| MIGNOLO | 3,00% | 2,66% | 2,18% |
| FRATTURA SECONDA FALANGE DITA | | | |
| POLLICE | 3,00% | 2,66% | 2,18% |
| INDICE | 2,50% | 2,22% | 1,81% |
| MEDIO | 2,00% | 1,78% | 1,45% |
| ANULARE | 1,00% | 0,89% | 0,73% |
| MIGNOLO | 2,00% | 1,78% | 1,45% |
| FRATTURA TERZA FALANGE DITA | | | |
| INDICE | 2,00% | 1,78% | 1,45% |
| MEDIO | 1,00% | 0,89% | 0,73% |
| ANULARE | 1,00% | 0,89% | 0,73% |
| MIGNOLO | 2,00% | 1,78% | 1,45% |

| TIPOLOGIA DI LESIONE | PERC. | | FRANCHIGIA INTEGRATIVA |
|--|--------|--------|---------------------------|
| ARTO INFERIORE(DX o Sx) | | | |
| FRATTURA FEMORE | | | |
| DIAFISARIA | 6,00% | 5,33% | 4,35% |
| EPIFISI PROSSIMALE (Delímitata dal collo chirurgico) | 10,00% | 8,88% | 7,25% |
| EPIFISI DISTALE (Delimitata da una linea ideale che congiunge i due epicondili attraverso la fossa intercondiloidea e quella sopratrocleare) | 10,00% | 8,88% | 7,25% |
| FRATTURA ROTULA | 4,00% | 3,55% | 2,90% |
| FRATTURA TIBIA | | | |
| DIAFISARIA | 3,00% | 2,66% | 2,18% |
| ESTREMITA'SUPERIORE (eminenza intercondíloidea o faccette articolari superiori o condili o faccette articolare fibulare) | 5,00% | 4,44% | 3,63% |
| ESTREMITA' INFERIORE (malleolo mediale o faccetta articolare inferiore) | 5,00% | 4,44% | 3,63% |
| FRATTURA PERONE | | | |
| DIAFISARIA | 2,00% | 1,78% | 1,45% |
| ESTREMRTA' SUPERIORE(capitello o faccetta articolare tibiale) | 3,00% | 2,66% | 2,18% |
| ESTREMITA' INFERIORE (malleolo laterale o faccetta articolare) | 4,00% | 3,55% | 2,90% |
| FRATTURA BIOSSEA TIBIA E PERONE COMPOSTA | 5,00% | 4,44% | 3,63% |
| FRATTURA BIOSSEA TIBIA E PERONE SCOMPOSTA | 6,00% | 5,33% | 4,35% |
| PIEDE | | | |
| TARSO | | | |
| FRATTURA ASTRAGALO | 6.00% | 5,33% | 4,35% |
| FRATTURA CALCAGNO | 7,00% | | , |
| FRATTURA SCAFOIDE | 3,00% | 2,66% | 2,18% |
| FRATTURA CUSOIDE | 4,00% | 3,55% | 2,90% |
| FRATTURA CUNEIFORME | 1,00% | 0,89% | 0,73% |
| METATARSI | | | |
| FRATTURA I° METATARSALE | 4,00% | 3,55% | 2,90% |
| FRATTURA II° O III° O IV° O V° METATARSALE | 2,00% | | |
| FALANGI | | | |
| FRATTURA ALLUCE (I° o II° Falange) | 2,50% | 2,22% | 1,81% |
| FRATTURA I° o III° o III° FALANGE DI OGNI ALTRO DITO DEL PIEDE | 1,00% | | 0,73% |
| THAT TO VALUE OF THE STATE OF T | 1,0076 | 0,00/6 | 0,7076 |

| TIPOLOGIA DI LESIONE | PERC. | FRANCHIGIA BASE | FRANCHIGIA INTEGRATIVA |
|--|---------|--------------------|---------------------------|
| LESIONI DENTARIE | | DAGE | III ZGIIAIIVA |
| ROTTURA INCISIVO CENTRALE SUPERIORE (per ogni dente) | 0,70% | 0,62% | 0,51% |
| ROTTURA INCISIVO CENTRALE INFERIORE (per ogni dente) | 0,20% | * | * |
| ROTTURA INCISIVO LATERALE (per ogni dente) | 0,50% | | , |
| ROTTURA CANINI (per ogni dente) | 1,00% | , | 0,73% |
| ROTTURA PRIMI PREMOLARI (per ogni dente) | 0,50% | * | * |
| R0TTURA SECONDI PREMOLARI (per ogni dente) | 0,75% | | 0,54% |
| ROTTURA PRIMI MOLARI (per ogni dente) | 1,50% | 1,33% | 1,09% |
| ROTTURA SECONDI MOLARI (per ogni dente) | 1,00% | , | , |
| ROTTURA TERZO MOLARE SUPERIORE | 0,25% | | 0,18% |
| ROTTURA TERZO MOLARE INFERIORE | 0,50% | , | , |
| LESIONI PARTICOLARI | | | |
| ASPORTAZIONE CHIRURGICA DI PARTE DI TECA CRANICA (indipendentemente dall'estensione della breccia) | 8,00% | 7,10% | 5,80% |
| ROTTURA MILZA CON SPLENECTOMIA | 10,00% | | , |
| ROTTURA RENE CON NEFRECTOMIA | 15,00% | 0,00% | 0,00% |
| ESITI EPATECTOMIA (oltre un terzo del parenchima) | 10,00% | 8,88% | 7,25% |
| GASRTRORESEZIONE ESTESA (oltre la metà) o GASTRECTOMIA TOTALE | 40,00% | 0,00% | 0,00% |
| RESEZIONE DEL TENUE (fino al 70% con conservazione valvola (leo-cecale) -non cumulabile- | 20,00% | 0.00% | 0,00% |
| RESEZIONE DEL TENUE (oltre il 70% con coinvolgimento valvola ileo-cecale)non cumulabile- | 40,00% | 0,00% | 0,00% |
| RESEZIONE PARZIALE DEL COLON CON INTEGRITA'DEL RETTO -non cumulabile- | 15,00% | 0,00% | 0,00% |
| COLECTOMIA TOTALE -non cumulabile- | 40,00% | 0,00% | 0,00% |
| AMPUTAZIONE ADDOMINO-PERINEALE E ANO PRETERNATURALE -non cumulabile- | 60,00% | 0,00% | 0,00% |
| COLECISTECTOMIA -non cumulabile- | 5,00% | 4,44% | 3,63% |
| SAFENECTOMIA MONOLATERALE O EMORROIDECTOMIA | 4,00% | 3,55% | 2,90% |
| SAFENECTOMIA BILATERALE (non cumulabile) | 6,00% | 5,33% | 4,35% |
| EPATITI TOSSICHE O INFETTIVE (con test enzimatící e sieroproteici alterati e con bilirubinemia oltre i valori normali) | 10,00% | 8,88% | 7,25% |
| PORTATORE A SINTOMATICO A NTICORPO POSMVO (HIV +) | 4,00% | 3,55% | 2,90% |
| PANCREATECTOMIA SUBTOTALE (oltre la metà) O TOTALE -non cumulabíle- | 50,00% | 0,00% | 0,00% |
| ERNIA CRURALE O IPOIEPIGASTRICA O OMBELICALE O DIAFRAMMATICA (trattate chírurgicamente) | 3,00% | 2,66% | 2,18% |
| ERNIA INGUINALE (trattata chirurgícamente) | 5,00% | 4,44% | 3,63% |
| LOBECTOMIA POLMONARE | 15,00% | 0,00% | 0,00% |
| PNEUMONECTOMIA | 30,00% | 0,00% | 0,00% |
| PROTESI SU AORTA TORACICA | 20,00% | 0,00% | 0,00% |
| PROTESI SU AORTA ADDOMINALE | 15,00% | 0,00% | 0,00% |
| PERDITA ANATOMICA DI UN GLOBO OCULARE | 35,00% | 0,00% | 0,00% |
| CECITA' MONOLATERALE (Perdita irreversibile non inferiore a 9/10 di visus) | 25,00% | 0,00% | |
| PERDITA TOTALE DELLA FACOLTA' VISIVA DI AMBEDUE GLI OCCHI | 100,00% | * | * |
| SORDITA' COMPLETA UNILATERALE | 12,00% | | 0,00% |
| SORDITA' COMPLETA BILATERALE | 50,00% | | |
| | | | |

| TIPOLOGIA DI LESIONE | PERC. | FRANCHIGIA BASE | FRANCHIGIA INTEGRATIVA |
|--|--------|--------------------|---------------------------|
| PERDITA NASO (oltre i due terzi) | 30,00% | | 0,00% |
| CORDECTOMIA | 15,00% | 0,00% | 0,00% |
| EMILARINGECTOMIA | 25,00% | 0,00% | 0,00% |
| LARINGECTOMIA | 50,00% | 0,00% | 0,00% |
| PERDITA LINGUA (oltre i due terzi) | 70,00% | 0,00% | 0,00% |
| PERDITA COMPLETA DI UN PADIGLIONE AURICOLARE | 8,00% | 7,10% | 5,80% |
| PERDITA COMPLETA DI ENTRAMBI I PADIGLIONI AURICOLARI | 15,00% | 0,00% | 0,00% |
| ERNIA DISCALE DA SFORZO (unica o plurima-trattata/e chirurgicamente-) | 8,00% | 7,10% | 5,80% |
| ROTTURA SOTTOCUTANEA TENDINE D'ACHILLE (trattata chirurgicamente) | 4,00% | 3,55% | 2,90% |
| PROTESI D'ANCA (non cumulabile) | 20,00% | 0,00% | 0,00% |
| PROTESI DI GINOCCHIO (non cumulabile) | 25,00% | 0,00% | 0,00% |
| PATELLECTOMIA TOTALE | 10,00% | 8,88% | 7,25% |
| PATELLECTOMIA PARZIALE | 4,00% | 3,55% | 2,90% |
| PERDITA ANATOMICA DI UN TESTICOLO | 5,00% | 4,44% | 3,63% |
| PERDITA ANATOMICA DEI DUE TESTICOLI | 25,00% | 0,00% | 0,00% |
| PERDITA ANATOMICA DEL PENE | 30,00% | 0,00% | 0,00% |
| ISTERECTOMIA (non cumulabíle) | 20,00% | 0,00% | 0,00% |
| ISTEROANNESSIECTOMIA BILATERALE | 30,00% | 0,00% | 0,00% |
| OVARIECTOMIA O SALPINGECTOMIA MONOLATERALE | 5,00% | 4,44% | 3,63% |
| USTIONI ESTESE A PIU' DEL 25% DELLA SUPERFICIE CORPOREA (Documentate fotograficamente) | 30,00% | , | , |
| PTOSI PALPEBRALE | 5,00% | 4,44% | 3,63% |
| EVIRAZIONE COMPLETA | 45,00% | 0,00% | 0,00% |
| PERDITA DEL PENE | 35,00% | , | , |
| IMPOSSIBILITA' ALL'EREZIONE | 25,00% | , | , |
| CASTRAZIONE | 25,00% | 0,00% | 0,00% |

| TIPOLOGIA DI LESIONE | PERC. | FRANCHIGIA BASE | FRANCHIGIA INTEGRATIVA |
|--|--------|--------------------|---------------------------|
| LESIONI MUSCOLO-TENDINEE | | | |
| ROTTURA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI (trattata chirurgicamente) -non cumulabíle- | 9,00% | 7,99% | 6,53% |
| ROTTURA DEL TENDINE DISTALE DEL BICIPITE BRACHIALE (trattata chirurgicamente) | 5,00% | 4,44% | 3,63% |
| R0TTURA DEL TENDINE PROSSIMALE DEL BICIPITE BRACHIALE (trattata chirurgicamente) | 7,00% | 6,21% | 5,08% |
| ROTTURA DEI TENDINI DELLE DITA DI UNA MANO (trattata chirurgicamente) -valore massimo per ogni dito- | 3,00% | 2,66% | 2,18% |
| ROTTURA DEI TENDINI DEL QUADRICIPITE FEMORALE (trattata chirurgicamente) -non cumulabíle- | 6,00% | 5,33% | 4,35% |
| LUSSAZIONE ARTICOLAZIONE TEMPORO-MANDIBOLARE (Documentata radiologicamente) | 4,00% | 3,55% | 2,90% |
| LUSSAZIONE RECIDIVANTE GLENO-OMERALE (trattata chirurgicamente) | 7,00% | 6,21% | 5,08% |
| LUSSAZIONE GLENO-OMERALE (evidenziata radiologicamente) | 5,00% | 4,44% | 3,63% |
| LUSSAZIONE STERNO-CLAVEARE (trattata chirurgicamente) | 3,00% | 2,66% | 2,18% |
| LUSSAZIONE ACROMION-CLAVEARE (trattata chirurgicamente) | 4,00% | 3,55% | 2,90% |
| LUSSAZIONE GOMITO (evidenziata radiologicamente) | 6,00% | 5,33% | 4,35% |
| LUSSAZIONE RADIO-CARPICA (trattata chirurgicamente)-non cumulabíle- | 5,00% | 4,44% | 3,63% |
| LUSSAZIONE MF O IF 2° - 3° - 4° - 5° DITO DELLA MANO (evidenziata radiologicamente)-valore massimo per ogni dito- | 2,50% | 2,22% | 1,81% |
| LUSSAZIONE MF O IF POLLICE (trattata chírurgicamente) | 4,00% | 3,55% | 2,90% |
| LUSSAZIONE D'ANCA (Documentata radiologicamente) | 10,00% | 8,88% | 7,25% |
| LUSSAZIONE METATARSO-FALANGEA O IF DELL'ALLUCE (Documentata radiologicamente) | 2,00% | 1,78% | 1,45% |
| LUSSAZIONE METATARSO-FALANGEA O IF II° O III° O IV° O V° DITO DEL PIEDE (Documentata radiologicamente) | 1,00% | 0,89% | 0,73% |
| LESIONE DEI LEGAMENTI COLLATERALI DEL GINOCCHIO (trattata chírurgícamente) | 5,00% | 4,44% | 3,63% |
| LESIONI DEL CROCIATO ANTERIORE O POSTERIORE O DEL PIATTO TIBIALE (trattate chirurgicamente)-non cumulabili tra loro- | 8,00% | 7,10% | 5,80% |
| LESIONI ISOLATE DELLA CAPSULA O MENISCALI (trattate chirurgicamente) non cumulabili tra loro- | 2,50% | 2,22% | 1,81% |
| LESIONE TENDINE ROTULEO (trattata chirurgicamente) | 2,50% | 2,22% | 1,81% |
| LESIONI CAPSULO-LEGAMENTOSE DELLA TIBIO-PERONEO-ASTRAGALICA (trattate chirurgicamente) non cumulabili tra loro- | 6,00% | 5,33% | 4,35% |
| LUSSAZIONE ULNOCARPICA | 3,00% | 2,66% | 2,18% |
| LUSSAZIONE ROTULA | 3,00% | 2,66% | 2,18% |
| LUSSAZIONE TIBIOCARSICA | 3,00% | 2,66% | 2,18% |
| LUSSAZIONE VERTEBRALE | 5,00% | 4,44% | 3,63% |

| TIPOLOGIA DI LESIONE | PERC. | FRANCHIGIA BASE | FRANCHIGIA INTEGRATIVA |
|---|--------|--------------------|---------------------------|
| AMPUTAZIONI | | DAGE | INTEGRATIVA |
| | | | |
| ARTO SUPERIORE | | | |
| AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELL'ARTO SUPERIORE | 80,00% | 0,00% | 0,00% |
| AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELL'AVAMBRACCIO | 70,00% | 0,00% | 0,00% |
| AMPUTAZIONE DI UNA MANO O DI TUTTE LE DITA DI UNA MANO | 65,00% | 0,00% | 0,00% |
| AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE E MEDIO E ANULARE | 52,00% | 0,00% | 0,00% |
| AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE E MEDIO E MIGNOLO | 58,00% | 0,00% | 0,00% |
| AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE E ANULARE E MIGNOLO | 56,00% | 0,00% | 0,00% |
| AMPUTAZIONE POLLICE E MEDIO E ANULARE E MIGNOLO | 50,00% | 0,00% | 0,00% |
| AMPUTAZIONE INDICE E MEDIO E ANULARE E MIGNOLO | 44,00% | 0,00% | 0,00% |
| AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE E MEDIO | 45,00% | 0,00% | 0,00% |
| AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE E ANULARE | 42,00% | 0,00% | 0,00% |
| AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE E MIGNOLO | 47,00% | 0,00% | 0,00% |
| AMPUTAZIONE POLLICE E MEDIO E ANULARE | 38,00% | 0,00% | 0,00% |
| AMPUTAZIONE POLLICE E MEDIO E MIGNOLO | 43,00% | 0,00% | 0,00% |
| AMPUTAZIONE POLLICE E ANULARE E MIGNOLO | 40,00% | 0,00% | 0,00% |
| AMPUTAZIONE INDICE E MEDIO E ANULARE | 32,00% | 0,00% | 0,00% |
| AMPUTAZIONE INDICE E MEDIO E MIGNOLO | 37,00% | 0,00% | 0,00% |
| AMPUTAZIONE MEDIO E ANULARE E MIGNOLO | 30,00% | 0,00% | 0,00% |
| AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE | 35,00% | 0,00% | 0,00% |
| AMPUTAZIONE POLLICE E MEDIO | 35,00% | 0,00% | 0,00% |
| AMPUTAZIONE POLLICE E ANULARE | 28,00% | 0,00% | 0,00% |
| AMPUTAZIONE POLLICE E MIGNOLO | 33,00% | 0,00% | 0,00% |
| AMPUTAZIONE INDICE E MEDIO | 24,00% | 0,00% | 0,00% |
| AMPUTAZIONE INDICE E ANULARE | 22,00% | 0,00% | 0,00% |
| AMPUTAZIONE INDICE E MIGNOLO | 27,00% | 0,00% | 0,00% |
| AMPUTAZIONE MEDIO E ANULARE | 18,00% | 0,00% | 0,00% |
| AMPUTAZIONE MEDIO E MIGNOLO | 23,00% | 0,00% | 0,00% |
| AMPUTAZIONE ANULARE E MIGNOLO | 20,00% | 0,00% | 0,00% |
| AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DEL POLLICE | 20,00% | 0,00% | 0,00% |
| AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELL'INDICE | 14,00% | 0,00% | 0,00% |
| AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DEL MEDIO | 10,00% | 8,88% | 7,25% |
| AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELL'ANULARE | 7,00% | 6,21% | 5,08% |
| AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DEL MIGNOLO | 12,00% | 0,00% | 0,00% |
| AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELLA FALANGE UNGUEALE DEL POLLICE | 13,00% | 0,00% | 0,00% |
| AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELLA FALANGE UNGUEALE DELL'INDICE | 5,00% | 4,44% | 3,63% |
| AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELLA FALANGE UNGUEALE DEL MEDIO | 3,50% | 3,11% | 2,54% |
| AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELLA FALANGE UNGUEALE DELL'ANULARE | 2,50% | 2,22% | 1,81% |
| AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELLA FALANGE UNGUEALE DEL MIGNOLO | 4,50% | 3,99% | 3,26% |
| AMPUTAZIONE DELLA II° E III° FALANGE DELL'INDICE | 10,00% | 8,88% | 7,25% |
| | | | |

| TIPOLOGIA DI LESIONE | PERC. | FRANCHIGIA BASE | FRANCHIGIA INTEGRATIVA |
|---|---------|--------------------|---------------------------|
| AMPUTAZIONE DELLA II° E III° FALANGE DEL MEDIO | 8,00% | 7,10% | |
| AMPUTAZIONE DELLA II° E III° FALANGE DELL'ANULARE | 6,00% | 5,33% | |
| AMPUTAZIONE DELLA II° E III° FALANGE DEL MIGNOLO | 9,00% | 7,99% | , |
| | | | |
| ARTO INFERIORE | | | |
| AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELL'ARTO INFERIORE (al di sopra dellametà della coscia) | 70,00% | 0,00% | 0,00% |
| AMPUTAZIONE AL DI SOTTO DELLA META' DELLA COSCIA (ma al dí sopra dei ginocchio) | 65,00% | 0,00% | 0,00% |
| AMPUTAZIONE TOTALE O OLTRE I DUE TERZI DELLA GAMBA (al dí sotto dei ginocchio) | 65,00% | 0,00% | 0,00% |
| AMPUTAZIONE DI GAMBA AL TERZO INFERIORE | 50,00% | 0,00% | 0,00% |
| PERDITA DI UN PIEDE | 45,00% | 0,00% | 0,00% |
| PERDITA DELL'AVAMPIEDE ALLA LINEA TARSO-METATARSALE | 27,00% | 0,00% | 0,00% |
| PERDITA DI AMBEDUE I PIEDI | 100,00% | 0,00% | , |
| PERDITA DELL'ALLUCE | 6,00% | 5,33% | 4,35% |
| PERDITA DELLA FALANGE UNGUEALE DELL'ALLUCE | 3,00% | 2,66% | , |
| PERDITA DI OGNI ALTRO DITO DEL PIEDE | 1,00% | 0,89% | 0,73% |
| LESIONI SISTEMA NERVOSO PERIFERICO | | | |
| ARTO SUPERIORE | | | |
| LESIONE TOTALE PLESSO BRACHIALE | 60,00% | 0,00% | 0,00% |
| SINDROME RADICOLARE SUPERIORE TIPO DUCHENNE | 45,00% | 0,00% | , |
| SINDROME RADICOLARE INFERIORE TIPO DEJERINE | 45,00% | 0,00% | , |
| PARALISI COMPLETA NERVO ASCELLARE | 18,00% | 0,00% | , |
| PARALISI COMPLETA NERVO RADIALE | 35,00% | 0,00% | |
| PARALISI BASSA NERVO RADIALE | 25,00% | 0,00% | 0,00% |
| PARALISI COMPLETA NERVO MEDIANO | 40,00% | 0,00% | 0,00% |
| PARALISI COMPLETA NERVO ULNA | 25,00% | 0,00% | 0,00% |
| PARALISI BASSA NERVO ULNARE | 20,00% | 0,00% | 0,00% |
| ARTO INFERIORE | | | |
| DADALICI COMDI ETA DI ECCO I OMBADE | 05.000/ | 0.000/ | 0.000/ |
| PARALISI COMPLETA PLESSO LOMBARE | 35,00% | 0,00% | 0,00% |
| PARALISI COMPLETA NERVO FEMORALE | 30,00% | 0,00% | |
| PARALISI COMPLETA NERVO SCIATICO | 45,00% | 0,00% | , |
| PARALISI BASSA NERVO SCIATICO | 38,00% | 0,00% | |
| PARALISI COMPLETA NERVO SCIATICO POPLITEO ESTERNO PARALISI COMPLETA NERVO SCIATICO POPLITEO INTERNO | 20,00% | 0,00% | 0,00% |
| FARALISI COMIFLE IA NERVO SCIATICO POPLITEO INTERNO | 22,00% | 0,00% | 0,00% |

| TIPOLOGIA DI LESIONE | PERC. | | FRANCHIGIA INTEGRATIVA |
|--|--------|-------|---------------------------|
| LESIONI SISTEMA NERVOSO CENTRALE | | | |
| EPILESSIA POST TRAUMATICA, CONTROLLATA FARMACOLOGICAMENTE CON CRISI SPORADICHE | 15,00% | 0,00% | 0,00% |
| EPILESSIA POST TRAUMATICA CONTROLLATA FARMACOLOGICAMENTE CON CRISI SETTIMANALE | 30,00% | 0,00% | 0,00% |
| PARAPARESI CON DEFICIT DI FORZA MODERATA E POSSIBILITÀ DI DEAMBULAZIONE CON APPOGGIO | 40,00% | 0,00% | 0,00% |
| MONOPARESI DI ARTO SUPERIORE CON DEFICIT DI FORZA E IMPOSSIBILITÀ AI MOVIMENTI FINI DELLA MANO | 40,00% | 0,00% | 0,00% |
| MONOPARESI DI ARTO INFERIORE CON MODERATO DEFICIT DI FORZA, ANDATURA FALCIANTE E POSSSBILE SOLO CON APPOGGIO | 35,00% | 0,00% | 0,00% |
| USTIONI | | | |
| CAPO | | | |
| USTIONE 2' O 3' GRADO DEL 6-10% DELLA SUPERFICIE DEL VISO | 3,00% | 2,66% | 2,18% |
| USTIONE 2' O 3' GRADO DEL 11-15% DELLA SUPERFICIE DEL VISO | 10,00% | 8,88% | 7,25% |
| USTIONE 2' O 3' GRADO DEL 16-25% DELLA SUPERFICIE DEL VISO | 14,00% | 0,00% | 0,00% |
| USTIONE 2' O 3' GRADO SUPERIORE AL 25 % DELLA SUPERFICIE DEL VISO | 18,00% | 0,00% | 0,00% |
| USTIONE 2' O 3' GRADO DEL 15-30% DELLA SUPERFICIE DEL CUOIO CAPELLUTO | 5,00% | 4,44% | 3,63% |
| USTIONE 2' O 3' GRADO SUPERIORE AL 30 % DELLA SUPERFICIE DEL CUIO CAPELLUTO | 10,00% | 8,88% | 7,25% |
| ARTI SUPERIORI E INFERIORI | | | |
| USTIONE 2' 0 3' GRADO DI 11-20% DELLA SUPERFICIE DI ARTO SUPERIORE O INFERIORE | 5,00% | 4,44% | 3,63% |
| USTIONE 2' 0 3' GRADO DI 21-30% DELLA SUPERFICIE DI ARTO SUPERIORE O INFERIORE | 10,00% | 8,88% | 7,25% |
| USTIONE 2' 0 3' GRADO DI 31-50% DELLA SUPERFECIE DI ARTO SUPERIORE O INFERIORE | 15,00% | 0,00% | 0,00% |
| USITONE 2' 0 3' GRADO DI OLTRE IL 50 % DELLA SUPERFICIE DI ARTO SUPERIORE O INFERIORE | 20,00% | 0,00% | 0,00% |